

<b>Percentage berengeur in varkensvlees</b>		<b>Cumulatief</b>	<b>Eén op de</b>
Totaal	100%		
Waarvan vlees van vrouwelijke dieren; hier treedt geen berengeur op	50%	50%	2
Percentage zonder koud vlees; alleen verwarmd vlees heeft berengeur	53%	27%	4
Percentage berengeur per stukje vlees	1%	0,27%	377
Percentage consumenten dat gevoelig is voor berengeur	10%	0,03%	3.774

*Kans dat iemand geconfronteerd wordt met berengeur is één op de 3,774 porties*

<b>Kans op berengeur in jaren, berekening III</b>		<b>kans op berengeur in dagen per jaar</b>
Aantal dagen dat men vlees eet t.o.v. totaal (4,9 van de 7 dagen)	70%	
Totaal aantal dagen per jaar	365,00	255,50 dagen
Percentage varkensvlees t.o.v. totaal van de vleesconsumptie	54%	137,46 dagen
Af: percentage vrouwelijke dieren, deze hebben geen berengeur	50%	68,73 dagen
kans op beregeur volgens wetenschappelijk onderzoek	1%	0,69 dagen
percentage consumenten dat varkensvlees onacceptabel vindt	10%	0,07 dagen
af: koud vlees (alleen verwarmd vlees heeft berengeur)	47%	0,03 dagen
<b>kans op berengeur in aantal jaar</b>		<b>30,96 jaar</b>
af: percentage van het vlees dat buitenshuis gegeten wordt	30%	0,02 dagen
<b>Kans op berengeur thuis in aantal jaar</b>		<b>44,22 jaar</b>